

MOQUILLO EN AVES (CORIZA INFECCIOSA AVIAR) - SÍNTOMAS Y TRATAMIENTO



Por moquillo en aves hacemos referencia a una infección de las vías respiratorias superiores que afecta a pollos, gallinas y otras especies como codornices. Su nombre es coriza infecciosa aviar y también es conocida como crup. A primera vista, parece un simple resfriado, pero lo cierto es que puede tener **consecuencias muy graves**.

Es una enfermedad más habitual en los climas cálidos de países de Sudamérica, África o Medio y Lejano Oriente, aunque también puede darse en otros territorios, principalmente por el cambio climático.

Índice:

1. ¿Qué es el moquillo en aves?
2. Síntomas de moquillo en aves
3. Tratamiento del moquillo en aves
4. Control del moquillo en aves

1. ¿Qué es el moquillo en aves?:

El moquillo o, más exactamente, la coriza infecciosa aviar, es una **enfermedad respiratoria** causada por una bacteria llamada *Avibacterium paragallinarum*. Los síntomas comienzan a apreciarse unos 2-3 días tras el contagio. Se trata de una **enfermedad muy contagiosa** y con una mortalidad que puede llegar a ser importante. Esta se produce por septicemia o infección generalizada.

Además, la bacteria sobrevive durante días en entornos con poco oxígeno, como **el agua o las heces**. También permanece en aves que se mantienen como portadoras y que, normalmente, estarán asintomáticas, es decir, nos van a parecer completamente sanas. En realidad, son el principal reservorio de las bacterias. El contagio se produce por **contacto directo o indirecto** a través de agua, comida o accesorios contaminados. Por otro lado, el moquillo en pollos es más habitual que en aves adultas.

2. Síntomas de moquillo en aves:

La coriza infecciosa produce un cuadro clínico que se prolonga a lo largo de **2-3 semanas**, aunque, en función de la gravedad o la concurrencia con otras bacterias y virus, este período de tiempo puede verse aumentado. Destacan **síntomas como los siguientes**, que se presentan con mayor o menor intensidad:

- Secreción ocular.
- Secreción nasal.
- Hinchazón de la cara a causa de un edema o acumulación de líquido.
- Los ojos pueden aparecer cerrados por la inflamación.
- Sacudir y rascarse la cabeza.
- Estornudos.
- Tos.
- Dificultades respiratorias.
- Ruidos respiratorios.
- Anorexia, el ave no come ni bebe.
- Diarrea.
- Letargo.

- Cambio en la coloración de las barbas o barbillas, que adquieren una tonalidad azulada. En los gallos también pueden inflamarse.
- El moquillo en gallinas afecta a la puesta de huevos.



Si dispones de aves de corral, como gallinas y patos, es importante también conocer cuáles son las *Enfermedades de aves de corral* para poder evitarlas.

3. Tratamiento del moquillo en aves:

Pero ¿cómo curar el moquillo en aves? Al tratarse de una enfermedad bacteriana, se combate con **antibióticos para el moquillo en aves** que, por supuesto, siempre debe prescribir el veterinario. Se pueden administrar en el agua o por inyección en los casos más graves y en aquellos en los que las gallinas no están comiendo ni bebiendo. Este profesional debe distinguir la coriza del *cólera aviar* o de la falta de vitaminas, problemas que van a cursar con síntomas parecidos. El diagnóstico se puede confirmar enviando **muestras al laboratorio**, aunque esto suele hacerse con aves que fallecen y conviven con otras.

Aun con la vacuna contra el moquillo en aves, no todas las aves afectadas de moquillo consiguen recuperarse. Las que han estado enfermas de gravedad, **pueden quedar con secuelas** y se van a convertir en portadoras. Si atraviesan algún momento de especial estrés, es fácil que la enfermedad vuelva a manifestarse.



4. Control del moquillo en aves:

Es importante que centremos nuestros esfuerzos en la prevención y, sobre todo, en un manejo adecuado con recintos, comederos y bebederos limpios, a los que no puedan acceder otros animales, y una **alimentación adecuada** y de calidad, como te detallamos en este otro artículo de ¿Qué comen las gallinas? Con ello, evitamos el estrés y mejoramos la resistencia ante los patógenos.

Si tenemos más de una gallina, es conveniente **mantener separada a la enferma**. Podemos consultar con el veterinario sobre la pertinencia de la vacunación contra el moquillo en aves en nuestro caso. La vacuna no evita la infección, pero sí minimiza el cuadro clínico y reduce la propagación de la bacteria. Por último, si queremos aumentar la familia aviar, el recién llegado debe pasar por un período de cuarentena.

Este artículo es meramente informativo, en ExpertoAnimal.com no tenemos facultad para recetar tratamientos veterinarios ni realizar ningún tipo de diagnóstico. Te invitamos a que lleves a tu mascota al veterinario en el caso de que presente cualquier tipo de condición o malestar.

Bibliografía



- Crank, Rhonda. (2019). 5 Common Chicken Diseases and Symptoms. Backyard Poultry.

Vídeos relacionados con Moquillo en aves (coriza infecciosa aviar) - Síntomas y tratamiento

<https://youtu.be/kMeCkJJ3zeM?si=Wi3zFDMJt5-shaYJ>

FUENTE: www.expertoanimal.com

AUTOR: María Besteiros, Auxiliar técnico veterinario y peluquera canina y felina.

- *¿Qué te aparecido este artículo? ¿Estás de acuerdo?, Tienes una mascota idéntica o similar a la publicada en este artículo? ¿quieres compartir con nosotros tus conocimientos, su historia, tus anécdotas?*
- *¡Comenta lo que quieras! Nos encantará leerte y conocerte más*
- *Cuando compartes nos ayudarás a que otras personas conozcan nuestro trabajo y nuestra labor*
- *Puedes guardarte esta publicación y leerla más tarde*
- *Si te ha gustado, dale al like... y si deseas recibir más información, contacta con nosotros y nos dices qué temas de mascotas deseas leer o si lo prefieres, suscríbete y recibirás notificaciones sobre los nuevos artículos a publicar.*